



**AFSPRAKEN VOOR OPERATIES
BIJ PATIËNTEN MET DIABETES
(SUIKERZIEKTE)**

U wordt binnenkort geopereerd. Aangezien u diabetes (suikerziekte) heeft, vindt u hieronder belangrijke informatie.

❑ Als u bloedsuikerverlagende tabletten inneemt:

- De week voor uw operatie stopt u de wekelijkse injectie van Dulaglutide, Semaglutide of Tirzepatide.
- **3 dagen voor de operatie stopt u met de volgende tabletten als u deze gebruikt:**
 - Canagliflozine
 - Empagliflozine
 - Dapagliflozine
 - Ertugliflozine
- De avond voor de operatie kunt u wel eten en kunt u wel uw bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken, behalve Semaglutide. Ook de dagelijkse injectie Liraglutide of Lixisenatide slaat u over.
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
- De ochtend van de operatie mag u geen bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken.
- Bij een hypo-gevoel mag u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

❑ Als u insuline spuit

- De avond voor de operatie kunt u wel eten en kunt u wel uw kortwerkende insuline spuiten. De langwerkende insuline (zoals Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal) verlaagt u naar $\frac{3}{4}$ (75%) van uw normale dosering.
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
- Als u 's ochtends langwerkende insuline gebruikt (zoals Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal), dan moet u $\frac{3}{4}$ (75%) van uw eigen dosering spuiten.
- Als u 's ochtends kortwerkende insuline of een mix-insuline gebruikt, dan mag u geen insuline spuiten.
- Bij een hypo-gevoel mag u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

Als u bloedsuikerverlagende tabletten gebruikt én insuline spuit:

- De week voor uw operatie stopt u de wekelijkse injectie van Dulaglutide, Semaglutide of Tirzepatide.
- **3 dagen voor de operatie stopt u met de volgende tabletten als u dit gebruikt:**
 - Canagliflozine
 - Empagliflozine
 - Dapagliflozine
 - Ertugliflozine
- De avond voor de operatie mag u wel eten en kunt u wel uw kortwerkende insuline en uw bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken, behalve Semaglutide.
- Ook de dagelijkse injectie Liraglutide of Lixisenatide slaat u over. De langwerkende insuline (zoals Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal) verlaagt u naar $\frac{3}{4}$ (75%) van uw normale dosering.
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
- De ochtend van de operatie mag u geen bloedsuikerverlagende tabletten gebruiken.
- Als u in de ochtend langwerkende insuline gebruikt (zoals Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal), dan moet u $\frac{3}{4}$ van uw eigen dosering spuiten.
- Als u in de ochtend kortwerkende insuline of een mix-insuline gebruikt, dan mag u geen insuline spuiten.
- Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

☐ Patiënten die een insulinepomp gebruiken:

- De avond voor de operatie kunt u wel eten en wel uw insulinepomp gebruiken.
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen. Lees hiervoor de folder 'voorbereiding op uw operatie' goed door.
- Op de ochtend van de operatie moet u de basisstand van uw insulinepomp verlagen naar $\frac{3}{4}$ (75%) van normaal en dient u zichzelf geen extra bolussen toe.

- Heeft u een zelfregulerende insulinepomp, dan overlegt u met uw eigen diabetesverpleegkundige over de aanpassing voor de operatie.
- Op de ochtend van de operatie moet u de basisstand van de insulinepomp halveren.
- Bij een hypo-gevoel mag u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

In het ziekenhuis wordt het bloedsuikergehalte regelmatig gemeten. Als het nodig is krijgt u een infuus met glucose en insuline aangesloten.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u maandag tot vrijdag tussen 8.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur telefonisch contact opnemen met de Preoperatieve screening.

Franciscus Gasthuis (Rotterdam): 010 – 461 6410
Franciscus Vlietland (Schiedam): 010 – 893 1960

April 2025
1153