

EEN TIJDELIJKE TRACHEACANULE

Inleiding

Uw familielid of naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Op dit moment krijgt de patiënt ondersteuning van de ademhaling met behulp van een beademingsmachine. Omdat de ademhaling langere tijd moet worden overgenomen, wordt er een tracheacanule geplaatst. In deze folder leest u meer over de behandeling en wat het precies inhoudt.

Beademing door een tracheacanule

Als de patiënt langdurig beademd moet worden, kan de buis in de mond vervangen worden door een beademingsbuisje. Dit wordt ook wel een canule genoemd. Het aanleggen van de canule gebeurt op de afdeling zelf of op de operatiekamer. De arts maakt een kleine snede in de hals. Zo ontstaat er een directe verbinding met de luchtpijp. Via de opening komt de canule in de luchtpijp. Op de canule wordt de beademingsmachine aangesloten.



Verzorging

Na het plaatsen van de canule kan de opening in de hals wat nabloeden en zeer doen. Goede verzorging is erg belangrijk. De canule wordt een aantal keer per dag gereinigd door de verpleegkundige.

Doordat de beademingsbuis niet meer in de mond van de patiënt zit, heeft hij/zij hier zelf minder last van. Ook is het makkelijker om goede mondverzorging uit te voeren. Voor de patiënt is het ook makkelijker om zelfstandig slijm op te hoesten.

Ontwennen van de beademing

Door de tracheacanule is ontwennen van de beademingsmachine makkelijker. De beademing wordt stapsgewijs afgebouwd. Een patiënt moet steeds een aantal keer per dag zelfstandig ademen. Dit aantal en de duur wordt, als de patiënt het fysiek lukt, steeds verder verhoogd.

Het kan voorkomen dat het nodig is om een kleinere canule te plaatsen. Dit is een eenvoudige handeling en de patiënt heeft hier weinig last van.

Praten met een tracheacanule

Een tracheacanule wordt onder de stembanden geplaatst. Dit betekent dat de patiënt ook aan de beademing zou kunnen praten. Hier zitten wel een aantal voorwaarden aan. Informeer bij de verpleegkundige welke voorwaarden dit zijn en hoe dit in zijn werk gaat.

Eten en drinken

Eten en drinken is mogelijk als de patiënt zelfstandig ademt en bij bewustzijn is. De patiënt moet zelfstandig slijm op kunnen hoesten en een goede slikfunctie hebben om verslikken te voorkomen.

Canule verwijderen

Als de patiënt voldoende is hersteld en geen beademing meer nodig heeft, dan wordt de canule verwijderd. Het gaatje wordt afgeplakt en groeit meestal na 3 dagen weer dicht. Een klein litteken blijft helaas in de hals zichtbaar.

Vragen?

Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft. Stel gerust al uw vragen aan de arts of verpleegkundige die betrokken is bij de verzorging van uw familielid of naaste.