


KIJKOPERATIE IN DE BORSTHOLTE
(MEDIASTINOSCOPIE)

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Een mediastinoscopie is een kijkoperatie in de borstholte. Dit is het gebied achter het borstbeen in het bovenste deel van de borstholte tussen de rechter- en linkerlong. Hierin liggen het hart, de luchtpijp, de slokdarm, bloedvaten (onder andere de grote lichaamsslagader), zenuwen (waaronder de stembandzenuw), lymfeklieren en lymfevaten. Met behulp van de mediastinoscoop levert de operatie informatie op die nodig is om te kunnen beslissen welke behandeling gewenst is. De mediastinoscoop is een korte buis met een lichtbron en een camera. Via de buis kunnen ook instrumenten ingebracht worden.



De chirurg kan met de mediastinoscoop achter het borstbeen komen. Hij maakt hiervoor een kleine snee in de hals, vlak boven het borstbeen. De mediastinoscoop is een kleine camera met verlichting. Op een beeldscherm kan de chirurg de beelden zien. Voor microscopisch onderzoek worden met fijne instrumenten weefselmonsters (biopten) uit de lymfeklieren langs de luchtpijp genomen. Hierna wordt het sneetje in de huid met oplosbare hechtingen gesloten.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. De normale kans op complicaties is aanwezig, zoals nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking. Soms is na de operatie rond de wond een bloeditstorting te zien. Deze verdwijnt vanzelf zonder problemen. De kans op een infectie is klein. Een enkele maal treedt heesheid op, die doorgaans na enkele weken verdwijnt. Alleen als een tumor in de stembandzenuw is gegroeid, kan er blijvende heesheid ontstaan. Soms ontstaat er een bloeding tijdens de operatie. Deze is bijna altijd op te lossen. In zeldzame gevallen is de bloeding zo hevig, dat het niet te verhelpen is via de kleine operatieopening. Er is dan reden om de borstholte open te maken.

Na de ingreep

Na deze operatie hebt u niet veel pijn. Vooral de eerste dag kan een drukkend gevoel achter het borstbeen bestaan. Al snel kunt u weer normaal eten en drinken. U kunt meestal de volgende dag al het ziekenhuis verlaten. Het onderzoek van de weefselmonsters kan vijf tot tien dagen duren. De longarts of chirurg bespreekt de uitslag met u zodra deze binnen is. Meldt van de te voren bij uw arts als u het prettig vindt als iemand anders, familie of een bekende, bij dit gesprek aanwezig is.

Vragen

Stel uw vragen gerust aan uw behandelend arts of huisarts. Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u contact opnemen met de afdeling waar de behandeling plaatsvindt. Voor problemen na de operatie neemt u contact op met de huisarts of het ziekenhuis.