

KLEINE CHIRURGISCHE VERRICHTINGEN

Inleiding

Binnenkort ondergaat u een poliklinische behandeling. Dit is een kleine chirurgische ingreep onder plaatselijke verdoving.

Adviezen

Als voorbereiding op de poliklinische behandeling adviseren wij u het volgende:

- Zorg dat u normaal hebt gegeten en gedronken wanneer u voor behandeling komt.
- Trek gemakkelijke kleding aan.
- Gebruik geen make-up wanneer u aan uw gezicht wordt behandeld.
- Draag geen sieraden.
- Zorg dat u pijnstilling in huis hebt, zoals Paracetamol (tabletten of zetabletten).
- Wilt u, indien u medicijnen gebruikt, hiervan een lijstje of medicijnkaart meenemen.
- Bent u overgevoelig voor pleisters, jodium of bepaalde medicijnen, meldt u dit dan voor de ingreep aan uw behandelend specialist.
- Wij raden u aan iemand te vragen om u te begeleiden na de ingreep. Het is verstandig dat u niet zelf actief aan het verkeer deelneemt.
- Als u bloedverdunners gebruikt, geeft u dit dan direct door bij het maken van de afspraak. In overleg met de arts kan worden bepaald of u dit kan continueren.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de poliklinische operatiekamer.

Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel. Vooraf wordt de te opereren plaats gedesinfecteerd. U krijgt een prik om de plaats te verdoven.

Tijdens de ingreep wordt de te opereren plaats afgedekt met steriele blauwe doeken.

De wond wordt na de ingreep gehecht en verbonden met een pleister of een verband. Dit is afhankelijk van de soort behandeling.

Poliklinische behandelingen

Talgkliercyste

Dit is een onderhuidse opeenhoping van talg door een verstopte talgklier. De opeenhoping zit in een zakje (cyste) dat kan scheuren. Als dit gebeurt, ontstaat een ontsteking.

Behandeling: Door middel van een klein sneetje in de huid wordt de talgklier met zakje verwijderd. Het sluiten van de huid is afhankelijk van de mate van ontsteking.

Lipoom

Dit is een onderhuidse vetbobbels. Deze wordt veroorzaakt door een opeenhoping van vetcellen.

Behandeling: Door middel van een klein sneetje in de huid wordt de vetbobbels verwijderd. Voor het sluiten van de huid zal de arts bepalen of hij gebruik maakt van oplosbare of niet oplosbare hechtdraden. Alle nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u mee op een nazorgkaart.

Naevus

Dit is een moedervlek die bestaat uit opeenhoping van pigmentcellen.

Behandeling: Door middel van een omsnijding wordt de moedervlek verwijderd. Voor het sluiten van de huid zal de arts bepalen of hij gebruik maakt van oplosbare of niet oplosbare hechtdraden. Alle nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u mee op een nazorgkaart.

Arterie Temporalis Biopsie (ATB)

Dit is een ingreep die voornamelijk wordt verricht bij verdenking van een ontsteking van de vaten.

Behandeling: Door middel van een klein sneetje bij de slaap wordt dit slagadertje opgezocht. Er wordt een klein stukje tussenuit gehaald en opgestuurd voor onderzoek. Voor het sluiten van de huid zal de arts bepalen of hij gebruik maakt van oplosbare of niet oplosbare hechtdraden. Alle nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u mee op een nazorgkaart.

Ganglion

Dit is een zakje gevuld met gelei en bevindt zich altijd in de buurt van pezen of gewrichten, meestal in de pols of de voet.

Bij het verwijderen van een ganglion is de kans dat het terugkomt aanwezig.

Behandeling: Door middel van een klein sneetje in de huid wordt de ganglion (zakje gevuld met gelei) verwijderd. Voor het sluiten van de huid zal de arts bepalen of hij gebruik maakt van oplosbare of niet oplosbare hechtdraden. Alle nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u mee op een nazorgkaart.

Ingegroeide teennagel

Een ingegroeide teennagel komt meestal voor bij de grote teen. De nagel is hierbij in de huid gegroeid en geeft irritatie, pijn en ontsteking.

Behandeling: Door middel van een plaatselijke verdoving in de vorm van een injectie wordt de teen verdoofd. De nagel wordt blijvend versmald door de nagelrand weg te knippen.

Verstandig om een slipper mee te nemen voor na de ingreep. Alle nazorginstructies en leefstijladviezen krijgt u mee op een nazorgkaart.

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is, krijgt u nog enkele adviezen van de specialist of de assistente.

Naar huis

Als u aan een hand of voet wordt geholpen, is het verstandig om niet zelf naar huis te rijden. In de meeste andere gevallen kunt u zelfstandig naar huis gaan.

Weer thuis

Wanneer de verdoving is uitgewerkt kan er enige wondpijn ontstaan. U kunt dan een pijnstiller innemen.

Let op

Als u bloed verdunnende medicijnen gebruikt, waaronder ook (kinder-)aspirines worden verstaan, moet u dit altijd melden aan de specialist.

Mogelijke complicaties

Na alle ingrepen kunnen complicaties optreden. Denk hierbij aan nabloedingen en wondinfecties. U moet altijd contact met

ons opnemen bij problemen of ernstige pijnklachten. Onze contactgegevens staan verder op in de folder.

Bericht van verhindering

Bent u onverwachts voor de afspraak verhinderd? Als u onder behandeling bent in Franciscus Gasthuis, neem dan contact op met de polikliniek Chirurgie, via telefoonnummer 010 – 461 6163.

Bent u onder behandeling in Franciscus Berkel? Neem dan contact op via 010 – 461 7700.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Franciscus Gasthuis

Polikliniek Chirurgie, tijdens kantooruren, via telefoonnummer 010 – 461 6163.

Franciscus Vlietland

Polikliniek Chirurgie, tijdens kantooruren, via telefoonnummer 010 – 893 1820.

Buiten deze tijden kunt u bij spoed contact opnemen met de Spoedeisende Hulp:

- Franciscus Gasthuis (Rotterdam): 010 - 461 6720
- Franciscus Vlietland (Schiedam): 010 – 893 0101
(Bereikbaar van 8.00 uur tot 21.00 uur. Buiten deze uren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van Franciscus Gasthuis)