

ONSTEKING VAN DE ZWEETKLIEREN

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

In de huid zitten veel zweetklieren. Ontsteking van deze klieren kan voor problemen zorgen. Deze folder geeft u informatie over ontsteking van de zweetklier en mogelijke behandelingen. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier staat beschreven.

Wat is het?

Zweetklierontsteking komt vooral voor in de oksels en de liezen. Er ontstaan grote bulten die erg pijnlijk zijn. De ontstekingen keren vaak terug omdat onder de huid met pus gevulde holten kunnen ontstaan. Deze gangen gaan steeds opnieuw ontsteken. Hierdoor ontstaan littekens. De meeste mensen hebben pas na de pubertijd last van zweetklierontsteking. De grote zweetklieren zijn dan volledig ontwikkeld. De ontstekingen komen het meeste voor bij vrouwen. Waarschijnlijk spelen genetische aanleg, overgewicht, suikerziekte, hormonen en roken ook een rol.

Hoe ontstaat het?

De ontsteking ontstaat door een verstopping of afsluiting van de klier. Het zweet kan niet weg en een ontstekingsreactie gaat beginnen. De holte vult zich met pus. In ernstige gevallen kan er ook koorts optreden door de bacteriën die zich in de holte bevinden.

Behandeling met medicijnen

Er is een rigoureuze behandeling nodig om te voorkomen dat er veel littekenweefsel ontstaat en er andere complicaties optreden. Eerst wordt geprobeerd om de ontsteking te remmen met antibiotica. Soms krijgt u ook een injectie met corticosteroiden in de holten. Soms kan er ook verbetering optreden door het slikken van tabletten met een vitamine A afgeleide (retoinezuur).

Als geneesmiddelen onvoldoende werken, kunt u een operatie overwegen.

Chirurgische behandeling

Bij steeds terugkerende ontstekingen is het operatief verwijderen van de ontstekingshaarden vaak de beste keuze. Tijdens de operatie wordt de ontstoken klier geopend, grondig schoongemaakt en het dode weefsel wordt verwijderd. Hierbij wordt het ontstoken klierweefsel verwijderd. Soms wordt de huid niet gehecht en open gelaten, waarna de wond verlittekt. De arts zal deze operatiemogelijkheid met u bespreken.

Nazorg

Bij thuiskomst adviseren wij u om de wond 2 keer per dag te spoelen en droog te verbinden. Via de afdeling krijgt u een controle-afspraak mee voor op de polikliniek Chirurgie.

Vragen

Bij problemen of complicatie kunt u contact op nemen met de polikliniek Chirurgie via 010-893 00 00.