

**PRIKTEST**

---

FRANCISCUS GASTHUIS

## **Inleiding**

Veel mensen krijgen in hun leven wel eens te maken met een allergische reactie, die soms zo heftig is dat medische hulp wordt gezocht. U komt naar de polikliniek Dermatologie & Flebologisch centrum van Franciscus Gasthuis voor een onderzoek naar uw allergische reactie.

## **Wat is een allergie?**

Een allergische reactie is een overdreven reactie van het lichaam op een stof die eigenlijk geen kwaad kan. Een stof die dit veroorzaakt wordt een allergeen genoemd. Allergenen komen in de lucht voor ( huisstofmijten, pollen, huidschilfers van dieren), in voedingsmiddelen, in geneesmiddelen en insectengiften. Vaak is een regelmatig terugkerend (maanden of jaren) intensief contact van een stof met uw huid of slijmvliezen noodzakelijk om de allergie op te wekken. Niet alle stoffen veroorzaken een allergie. Contact van de slijmvliezen met deze stoffen kan bij personen met een allergische aanleg binnen enkele minuten aanleiding geven tot hooikoortsachtige en/of astmatische verschijnselen.

## **Waarom wordt er een priktest gedaan?**

Een priktest wordt gedaan om te kijken of u gevoelig bent voor bepaalde allergenen. Door de allergenen met speciale naaldjes in de huid te prikken, wordt de allergische reactie als het ware in het klein uitgelokt. Als u gevoelig bent is er na 15-20 minuten een zwelling te zien, met een rood gebied er om heen.

## **Priktest**

De priktest vindt doorgaans plaats op donderdagmiddag. De assistente brengt een druppel van het allergeen op uw huid aan, meestal op de binnenzijde van uw onderarm. Daarna krijgt u een prikje in de huid, door de druppel heen. Door dit prikje wordt de opname van het allergeen in de huid bevorderd. De assistente leest na twintig minuten de reactie af. De reactie op het allergeen wordt vergeleken met de reactie op twee controleprikken. Bij de ene controleprik wordt de oplosvloeistof van het allergeen in de huid gebracht (de negatieve controle).

Bij de andere controle wordt een klein beetje histamineoplossing in de huid gebracht (de positieve controle). Histamine is een stof die in het lichaam vrijkomt bij een allergische reactie. De controle prikken zijn nodig om de betrouwbaarheid van de rest te controleren. De assistente beoordeelt dan welke waarde eraan toegekend moet worden. Als een patiënt allergisch is, ontstaan roodheid en zwelling met jeuk. De sterkte van een reactie is een graadmeter voor de mate van allergie. Het duurt meestal een tot twee uur voordat de jeuk en zwelling is verdwenen.

## **Verdunningspriktest**

Bij een verdunningspriktest krijgt u aan aantal prikjes van hetzelfde allergeen (bijvoorbeeld verdovingsvloeistof of geneesmiddelen) met verschillende sterktes. Deze sterktes zijn van sterk verdund naar puur. Tussen de prikjes zit twintig minuten, waarna de assistente de reactie kan aflezen. Houdt u er rekening mee dat de verdunningspriktest anderhalf uur kan duren.

## **Voorschriften**

Nadat de priktesten zijn uitgevoerd mag u de geteste huidgebieden aan de binnenzijde van uw onderarm vijftien minuten niet aanraken.

## **Ongewenste reactie**

In zeer zeldzame gevallen kan er tijdens de priktesten een allergische reactie voorkomen. Op de polikliniek Dermatologie & Flebologisch centrum zijn middelen aanwezig om dit effectief te onderdrukken.

## **Vorbereiding**

Sommige medicijnen hebben invloed op het resultaat van het onderzoek. Een overzicht van deze medicijnen vindt u achterin deze folder. Als u een of meer van deze medicijnen gebruikt, mag u deze (tijdelijk) niet gebruiken. Als u hormoonzalf gebruikt, vragen wij u deze een week van tevoren niet meer op de onderarmen te smeren. Ook mag u op de dag van het onderzoek geen bodylotion, crème of zalf op uw armen smeren.

In overleg met uw dermatoloog moeten de medicijnen uit het overzicht voor het uitvoeren van de priktesten doorgaans drie dagen van te voren niet meer ingenomen worden.

### **Uw test kan niet doorgaan als:**

- u zwanger bent;
- u de afgelopen twee weken een infectie heeft gehad;
- u één van de tabletten slikt uit onderstaande lijst;
- u behandeld wordt met prednison in een dosering van 10 mg of hoger;
- u een ernstige hartziekte heeft;
- u een ernstige longziekte heeft;
- u een ernstige maag/darm ziekte heeft;
- u een ernstige leverziekte heeft;
- u een ernstige nierziekte heeft.

### **Bericht van verhindering**

De polikliniek Dermatologie & Flebologisch centrum houdt voor deze behandeling een strak tijdschema aan. Daarom vragen wij u vriendelijk om op tijd op uw afspraak te komen en bij verhindering tijdig af te bellen via telefoonnummer 010 - 461 6131.

### **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Dermatologie & Flebologisch centrum. Deze polikliniek is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer 010 - 461 6131. U vindt de polikliniek Dermatologie & Flebologisch centrum op de derde verdieping, balie 368.

## Overzicht medicijnenlijst

### Tabletten tegen allergie

| <b>Merknaam</b> | <b>Stofnaam</b>                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Aerius          | Desloratidine                      |
| Allefre         | Loratidine                         |
| Allergin        | Cetirizine                         |
| Atarax          | Hydroxyzine                        |
| Axis            | Nizatidine                         |
| Azaron          | Tripelennamine                     |
| Cinnipirine     | Cinnarizine                        |
| Claritine       | Loratidine                         |
| Cyxlokapron     | Tranexaminzuur                     |
| Doxergan        | Oxomemazine                        |
| Fenistil        | Dimentindeen                       |
| Incidal         | Mebhydroline                       |
| Kestine         | Ebastine                           |
| Mircol          | Mequitazine                        |
| Mizollen        | Mizolastine                        |
| Naxidine        | Nizatidine                         |
| Nedeltran       | Alimemazine                        |
| Pepcidin        | Famotidine                         |
| Periactin       | Cyproheptadine                     |
| Phenergan       | Promethazine                       |
| Polaramine      | Dexchlorfeniraminewaterstofmaleaat |
| Roxit           | Roxatidine                         |
| Semprex         | Acrivastine                        |
| Sibelium        | Flunarizine                        |
| Suprimal        | Meclozine                          |
| Tagamet         | Cimetidine                         |
| Tavegil         | Clemastine                         |
| Telfast         | Fexofenadine                       |
| Tinset          | Oxatomide                          |
| Triludan        | Terfenadine                        |
| Xyzal           | Levocetirizine                     |
| Zaditen         | Ketotifen                          |
| Zantac          | Ranitidine                         |
| Zyrtec          | Cetirizine                         |

### Tabletten bij astma

| <b>Merknaam</b> | <b>Stofnaam</b> |
|-----------------|-----------------|
| Singulair       | Montelukast     |

### Middelen bij reisziekte

| <b>Merknaam</b> | <b>Stofnaam</b>                 |
|-----------------|---------------------------------|
| Primatour       | Cinnarizine met Chloorcyclizine |
| Cyclizine       | Cyclizine                       |
| Emasafene       | Meclozine/ pyridoxine           |
| Suprimal        | Meclozine                       |

### Middelen tegen duizeligheid

| <b>Merknaam</b> | <b>Stofnaam</b> |
|-----------------|-----------------|
| Betaserc        | Betahistine     |
| Cinnarizine     | Cinnarizine     |
| Dogmatil        | Sulpiride       |
| Sibelium        | Flunarizine     |
| Nootropil       | Piracetam       |

### Middelen tegen hoesten

| <b>Merknaam</b> | <b>Stofnaam</b> |
|-----------------|-----------------|
| Promethazine    | Promethazine    |
| Toplexil        | Oxomemazine     |