

PROCTOSCOPIE / LIGATUUR
BEHANDELING VAN AAMBEIEN

FRANCISCUS VLIETLAND

Dhr./mevr. :.....

Afspraak datum :..... tijd:.....

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de afdeling Endoscopie, **1e etage route 1.06**. Op de begane grond neemt u lift B. Op de 1e etage gaat u linksaf en aan het einde rechtsaf. Vergeet niet uw aanvraagbriefje mee te brengen. Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij de Inschrijfbalie op de begane grond.

Doel van het onderzoek

Bij de behandeling worden rubber bandjes om de aambeien geplaatst, waardoor de bloedtoevoer van de aambei wordt afgesneden en de aambei afsterft. Deze komen vanzelf met uw ontlasting mee naar buiten. Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.*

Vorbereiding

Het is erg belangrijk dat uw bloedstolling in orde is. Als u bloed verdunnende middelen (acenocoumarol, Marcoumar of Plavix) via de trombosedienst gebruikt, moet u met de arts die het onderzoek aanvraagt overleggen of u hiermee door kunt gaan. Gebruikt u Ascal, Aspirine of Persantin? Dan kunt u hiermee doorgaan.

Verloop van het onderzoek

Een arts voert het onderzoek uit, geassisteerd door een endoscopieverpleegkundige. De verpleegkundige legt u uit wat er gaat gebeuren en begeleidt u tijdens het onderzoek.

- Wij vragen u plaats te nemen op een onderzoektafel. U zit op de knieën met uw buik op de tafel.
- Een star buisje (de rectoscoop) wordt via de anus in de endeldarm gebracht. Door de rectoscoop kan de arts direct de binnenkant van het laatste gedeelte van de endeldarm nauwkeurig bekijken. Dit geeft een vreemd gevoel.

- Vervolgens schuift de arts een elastisch rubber bandje over het slijmvlies boven de aambeï. Het inbrengen van het instrument en de elastiekjes kan een wat pijnlijk gevoel geven. Het is belangrijk dat u dan zo rustig mogelijk blijft liggen en u zoveel mogelijk ontspant.

Na het onderzoek

U kunt op eigen gelegenheid direct weer naar huis. Neem voor de zekerheid een extra onderbroek mee. De eerste 48 uur na de behandeling kunt u op de plaats van de behandeling nog een dof of pijnlijk gevoel hebben. Tevens kunt u het gevoel hebben dat u naar het toilet moet. Na verloop van enkele dagen droogt de aambeï vanzelf op en valt eraf.

Mogelijke risico's en complicaties

Het is mogelijk dat u de eerste zes tot veertien dagen na de behandeling wat bloedverlies hebt. Neem alleen bij ernstige bloedingen direct contact op met de Endoscopie afdeling.

- Tijdens kantooruren neemt u contact op met de afdeling Endoscopie via telefoonnummer **010 - 893 0000**.
- Buiten kantooruren neemt u contact op met de Spoed Eisende Hulp via telefoonnummer **010 - 893 9393**.

Uitslag en vragen

De arts bespreekt direct na het onderzoek de uitslag met u. Eventueel wordt er een vervolgbehandeling afgesproken.

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen het onderzoek tegemoet gaat. Heeft u andere vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met de afdeling Endoscopie via de receptie. Telefoonnummer: **010 - 893 0000**.

*** Wetenschappelijk onderzoek**

Als de arts bij u urine, bloed of weefsel afneemt voor onderzoek, dan kan het zijn dat dergelijk 'lichaamsmateriaal' overblijft. Dit materiaal kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor wordt inzicht verkregen in het ontstaan en de behandeling van ziekten. Onderzoek moet

aan strenge voorwaarden voldoen, zoals het anoniem verwerken van uw lichaamsmateriaal.

Alle belangrijke informatie over onderzoek van lichaamsmateriaal, vindt u via www.pathology.nl/voorlichting. Heeft u er bezwaar tegen dat uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt? Dan leest u in de folder op de website van Pathology hoe u bezwaar kunt maken.

Juni 2018