

GANGLION CERVICALE SUPERIOR

Inleiding

Het ganglion cervicale superior loopt aan de voorzijde van de tweede en derde nekwerfel en kan verantwoordelijk zijn voor verschillende pijnklachten. Vooral bij diverse vormen van hoofd- en aangezichtspijn kan deze zenuw een rol spelen, maar ook bij nek-, schouder-, arm-, en borstpijn.

Voor de behandeling

- U meldt zich 20 minuten voor de behandelafpraak bij de Polikliniek Pijnbestrijding.
- U trekt gemakkelijk zittende kleding aan.
- Wanneer u bloedverduunners gebruikt, krijgt u van uw specialist te horen of u deze kunt blijven slikken of dat u moet stoppen. Hoelang u moet stoppen is mede afhankelijk van de soort bloedverdunner die u gebruikt.
- Indien u een allergie voor medicijnen heeft, meld dit dan voorafgaand aan de ingreep.
- Indien u een pacemaker of ICD heeft of aan epilepsie lijdt, meldt u dit bij uw specialist.
- Heeft u algemene ziekteverschijnselen, zoals koorts, hoesten of benauwdheid? Neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Pijnbestrijding.
- Bent u zwanger of vermoedt u dat zwanger bent, dan kan de behandeling niet door gaan. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen wordt gewerkt.
- Het bezoek blijft voor, tijdens en na de behandeling niet op zaal. Het bezoek mag wachten op de gang of in de centrale hal van het ziekenhuis.

Belangrijk! U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden. Ook alleen reizen met het openbaar vervoer (OV) is niet toegestaan. Zorg dat u door iemand wordt opgehaald met de auto of dat iemand u begeleidt in het openbaar vervoer (OV).

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de polikliniek Pijnbestrijding. Er wordt eventueel bij u een venflon (naaldje) door de verpleegkundige ingebracht. U gaat op de tafel op uw rug liggen met een klein kussentje onder uw hoofd. Vervolgens wordt de nek gedesinfecteerd. De pijnspecialist dekt de plaats af met een steriele doek. De behandeling vindt plaats met behulp van röntgenstralen, zodat de plaats van de naald goed te bepalen is. Als de goede plaats is bepaald, wordt de medicatie ingespoten.

Eerst wordt het ganglion cervicale superior met een medicamenteuze proefblokkade behandeld. Als blijkt dat uw pijnklachten duidelijk verbeteren, wordt op een later tijdstip een definitieve behandeling uitgevoerd door deze zenuw te verwarmen (PRF). Uw pijnklachten kunnen daardoor langduriger afnemen. U krijgt dan van ons een folder mee, waarin deze behandeling staat uitgelegd.

Na de behandeling verblijft u nog een 30 minuten ter controle op de polikliniek Pijnbestrijding. Voelt u zich na deze 30 minuten goed? Dan mag u naar huis.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren.

Toch bestaat er een kleine kans op complicaties:

- Napijn of een toename van pijn;
- Een bloeding;
- Een infectie. Krijgt u koorts? Neem dan contact op met uw pijnspecialist of huisarts.
- Een allergie voor de ingespoten medicatie;
- Kort na de inspuiting kan uw ooglid gaan hangen en heeft u een vernauwde pupil. Dit is tijdelijk en duurt een aantal uren tot een dag.

Als er ontstekingsremmers (corticosteroiden) zijn ingespoten, kunt u ongeveer tot 3 dagen na de behandeling last hebben van bijwerkingen. Deze gaan vanzelf weer over. Mogelijke bijwerkingen zijn:

- Een rood of warm gezicht;
- Opvliegers;
- Ontregelde menstruatie;
- De anticonceptiepil kan gedurende 1 cyclus minder betrouwbaar zijn;
- Spierkrampen;
- Verhoogde bloedsuikerspiegel. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Controleer dan de eerste dagen na de behandeling regelmatig de bloedsuikerspiegel.

Deze bijwerkingen verdwijnen na enige uren, als de verdoving is uitgewerkt.

Controle

Na de behandeling krijgt een telefonische controle. Tijdens dit gesprek wordt het effect van de blokkade goed gecontroleerd. Daarna worden de vervolgstappen met u besproken.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding.

- Franciscus Gasthuis

Op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.30 uur, via telefoonnummer 010 – 461 6674.

- Franciscus Vlietland

Van maandag tot en met donderdag tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.30 uur, via telefoonnummer 010 – 893 3223.