

**HISTAMINEPROVOCATIETEST**

---

## **Dit onderzoek vindt plaats in:**

### **Franciscus Vlietland**

Lift B, 1e etage.

Route 1.09

### **Franciscus Gasthuis**

1<sup>e</sup> etage, blok 150. Wij vragen u vriendelijk zich te melden bij balie 176.

Graag een kwartier van tevoren aanwezig zijn dit is vooral belangrijk indien u zelf van mening bent tot rust te moeten komen voor het onderzoek.

## Inleiding

De longfunctieanalist voert binnenkort een histamineprovocatietest bij u uit. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

## Doel van de test

Bij dit onderzoek meet de longfunctieanalist de prikkelbaarheid van de luchtwegen door u histamine te laten inhaleren. Door middel van dit onderzoek krijgt uw arts informatie over de gevoeligheid van uw luchtwegen.

## Vorbereiding

In de tabel op de volgende pagina staan de medicijnen die u niet mag gebruiken in de voorbereiding op het onderzoek. Het is noodzakelijk dat u tijdelijk met deze medicatie stopt. Wanneer het u niet lukt om de medicatie tijdelijk te staken, of u heeft per ongeluk uw medicatie gebruikt, dan kan het onderzoek niet doorgaan. Wij vragen u vriendelijk dan contact op te nemen met de Polikliniek Longgeneeskunde. De contactgegevens staan verderop in deze folder.

**Belangrijk: Stop 72 uur (3 dagen) voor de afspraak met uw allergiemedicatie (antihistaminica).**

### 6 uur van tevoren stoppen met:

<b>Merksnaam</b>	<b>Algemene naam</b>
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

### 12 uur van tevoren stoppen met:

<b>Merksnaam</b>	<b>Algemene naam</b>
Atrovent	Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium

### 36 uur van tevoren stoppen met:

<b>Merksnaam</b>	<b>Algemene naam</b>
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason
Aerivo	Salmeterol + Fluticason

Atimos	Formoterol
Bufoleer Easyhaler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuair	Aclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax	Formoterol + Budesonide
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason
Eklira Genuair	Aclidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclomethason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol + Budesonide
Singulair	Montelukast
Semprex	Acrivastine

#### **48 uur van tevoren stoppen met:**

<b>Merknaam</b>	<b>Algemene naam</b>
Daxas	Roflumilast, actieve metaboliet
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasofuroaat/vilanterol
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline

#### **7 dagen van tevoren stoppen met:**

<b>Merknaam</b>	<b>Algemene naam</b>
Anoro	Umeclidinium/vilanterol
Incruse Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Spiolto	Tiotropium/Olodaterol
Tiotrus Zondra	Tiotropium
Xoterna	Indacaterol/Glycopyrronium
Ultibro	Indacaterol/Glycopyrronium
Trimbow	Beclomethasondipropionaat/ Formoterolfumaraatdihydraat/ Glycopyrronium
Trelegly Ellipta	Fluticason/Vilanterol/Umeclidinium

## **U hoeft niet te stoppen met:**

<b>Merknaam</b>	<b>Algemene naam</b>
Qvar	Beclomethason
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide

### Luchtweginfectie

Heeft u recent last gehad van een luchtweginfectie? Neem dan contact op met de Polikliniek Longgeneeskunde om te beoordelen of het onderzoek door kan gaan.

### Zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Dan kan het onderzoek niet doorgaan. Neem contact op met de Polikliniek Longgeneeskunde om het onderzoek te annuleren.

### Roken en lichamelijke inspanning

Wij vragen u vriendelijk om op de dag van de test niet te roken en u ongeveer 1 uur voor uw afspraak niet te zwaar in te spannen.

**Wij willen u er vriendelijk op wijzen dat wegens veiligheidsoverwegingen kinderen niet zijn toegestaan in de onderzoekskamer. Ook naasten of eventuele begeleiders die last hebben van de luchtwegen zijn niet toegestaan.**

## **Het onderzoek**

Bij dit onderzoek meet de longfunctieanalist de prikkelbaarheid van de luchtwegen door u histamine te laten inhaleren. Daarna blaast u op de spirometer. Dit wordt enkele malen herhaald. Het kan gebeuren dat u tijdens de test een beetje benauwd wordt of gaat hoesten. U krijgt aan het einde van de test medicatie die deze klachten vrijwel direct doen verdwijnen. Na de test kunt u kortdurend last hebben van heesheid en/of keelpijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 70 minuten.

## **Vragen?**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, of uw afspraakdatum en -tijd wilt wijzigen, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek longgeneeskunde.

- Franciscus Vlietland

Polikliniek Longgeneeskunde telefoonnummer 010 – 893 9393.

- Franciscus Gasthuis

Polikliniek Longgeneeskunde telefoonnummer 010 – 461 6800.

*Juni 2021  
25732*