

PLEURAPUNCTIE

BEHANDELING VAN VOCHT TUSSEN DE
LONGVLIEZEN

Uw afspraak

Gegevens patiënt

Dhr./mevr.:.....

Afspraak pleurapunctie

Locatie afspraak:

- Franciscus Gasthuis, Rotterdam,
Poli longgeneeskunde, balie 176,
1^eetage

- Franciscus Vlietland, Schiedam
Scopiecentrum, balie 2.03, Lift C,
2^eetage

Afspraak datum:.....

Tijdstip melden:.....

Spoedeisende vragen

Bent u bekend bij de poli Oncologie:

Voor vragen voor het onderzoek kunt u contact opnemen met de polikliniek Oncologiecentrum 010 – 893 1476.

Voor medische spoedeisende vragen na de pleurapunctie kunt u contact opnemen met het spoednummer 010 – 893 9393 oproep 13013.

Bent u bekend bij de poli Longgeneeskunde:

Voor medisch spoedeisende vragen na de pleurapunctie kunt u tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 – 12.00 uur en 13.30 - 16.30 uur telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 010- 4616800.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met:

Spoed Eisende Hulp, Franciscus Gasthuis, via telefoonnummer 010- 461 6720

Spoed Eisende Hulp, Franciscus Vlietland, via telefoonnummer 010- 893 0101 Na 21.00 uur contact opnemen met Franciscus Gasthuis.

Inleiding

In overleg met uw behandelend longarts heeft u besloten om een pleurapunctie te verrichten. Door middel van een pleurapunctie kan achterhaald worden wat de oorzaak van de vochtproductie is. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Algemeen

Een pleurapunctie is een onderzoek waarbij vocht wordt weggenomen. De röntgenfoto laat zien dat er sprake is van pleuravocht. De longen zijn omgeven door twee longvliezen, waartussen zich pleuravocht kan ophopen als gevolg van een aandoening van de longvliezen. Dit kan tot diverse klachten leiden, waaronder benauwdheid.

Onderzoek

Er zijn 2 verschillende pleurapuncties:

- een diagnostische punctie, waarbij een kleine hoeveelheid vocht wordt weggenomen voor onderzoek;
- een ontlastende punctie, waarbij een grote hoeveelheid vocht wordt weggenomen om kortademigheid op te heffen.

Het verkregen materiaal wordt opgestuurd voor onderzoek.

Vorbereiding

Voor de pleurapunctie hoeft u **niet** nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon mag eten en drinken. Uw medicijnen kunt u de dag van het onderzoek gewoon innemen, met uitzondering van bloedverdunners en medicatie voor diabetes.

Melding aan uw arts

Vertel het uw arts als u:

- allergisch bent voor medicijnen of verdooving;
- (mogelijk) zwanger bent;
- hart- en vaataandoeningen heeft;
- een longaandoening heeft;
- een stoornis van de bloedstolling heeft;

- pijnstillers gebruikt zoals:
Aspirine (=acetylsalicylzuur), Voltaren (=diclofenac),
Ibuprofen (=Brufen) en Naprosyne (=naproxen).
Soms zal de arts deze medicatie tijdelijk willen staken;
- bloed verdunnende medicijnen (antistollingsmedicatie)
gebruikt. Meer informatie vindt u in de volgende alinea.

Medicatie

Bloedverdunnende medicijnen (antistollingsmedicatie)

Overleg vooraf met uw arts die het onderzoek aanvraagt als u bloedverdunnende medicijnen (antistollingsmedicatie) gebruikt, zoals:

- Sintrom (ook wel: acenocoumarol)
- Marcoumar (ook wel: fenprocoumon)
- Clopidogrel (ook wel: plavix)
- Ascal (ook wel: carbasalaatcalcium)

Geef het onderzoek ook door aan de trombosedienst in verband met uw inname schema.

Of wanneer u NOAC's (Nieuwe Orale Anti Coagulantie) medicijnen met een bloedverdunnende werking zoals:

- Rivaroxaban (xarelto)
- Dabigatran (pradaxa)
- Apixaban (eliquis)

Uw arts adviseert u dan in de meeste gevallen deze medicijnen gedurende enkele dagen voor het onderzoek niet in te nemen. Dit verschilt per medicijn.

Stop nooit zomaar uit u zelf met deze medicijnen!

Als u twijfelt of u moet stoppen met uw medicijnen, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen met de poli longgeneeskunde of de polikliniek Oncologiecentrum.

Wanneer u bent opgenomen op de verpleegafdeling wordt met de afdelingsarts besproken of en zo ja, wanneer u weer kunt starten met uw antistolling.

Meenemen naar het ziekenhuis

- Neem de medicijnen die u gebruikt of uw medicatieoverzicht van de apotheek mee naar het ziekenhuis. Hierbij zijn ook de medicijnen die u bij de drogist haalt van belang.
- Als u diabetes heeft en insuline spuit, neemt u uw prikpen en insuline mee naar het ziekenhuis. Zodoende kunt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis over insuline beschikken.

Onderzoek

Voor het onderzoek wordt u gevraagd uw bovenkleding uit te doen. Tijdens het onderzoek zit u op de rand van het bed of de onderzoekstafel met uw armen over elkaar voorovergebogen. Aan de hand van de röntgenfoto en echo-onderzoek wordt bepaald waar de pleurapunctie plaats moet vinden. Voordat de pleurapunctie begint, wordt de huid ontsmet met een koude vloeistof om infecties door bacteriën tegen te gaan. De longarts brengt een naald in tussen twee ribben, tot in de holte tussen de twee longbladen. Op de punctienaald zit een spuit, waarmee vocht wordt opgezogen. Na afloop krijgt u een pleister op de plek van de punctie.

Het verkregen materiaal wordt opgestuurd voor nader onderzoek. Gemiddeld duurt het onderzoek dertig minuten.

Er zijn twee verschillende pleurapuncties:

- Bij een diagnostische punctie prikt de longarts één keer om een klein beetje vocht weg te nemen. Bij deze punctie wordt u vooraf niet verdoofd.
- Bij een ontlastende punctie wordt een grotere hoeveelheid vocht (maximaal anderhalve liter) weggenomen. Bij deze punctie krijgt u van de longarts tevoren een plaatselijke verdoving. Het verdere onderzoek is door de verdoving vrijwel pijnloos.

Na de behandeling

Als u bent opgenomen gaat u terug naar de afdeling waar u bent opgenomen. Als u zich poliklinisch meldt mag u na de punctie direct naar huis. Het is verstandig om het eerste half uur rustig aan te doen.

Mogelijke klachten en risico's

Klachten komen zeer zelden voor. Er is een kleine kans dat ten gevolge van het onderzoek uw long gedeeltelijk samenvalt, dit noemen we een klaplong. Een klaplong ontstaat doordat de naald tegen de long gekomen is. Daardoor treedt lekkage van lucht vanuit de longen op. Om dit probleem op te lossen, wordt een drain (slangetje) in uw borstholte gebracht om de lucht af te zuigen. De long kan zich dan weer ontplooien.

In het geval van een klaplong wordt u opgenomen op de afdeling Longgeneeskunde. Dit duurt ongeveer 3 tot 5 dagen.

Wanneer u thuis klachten krijgt van koorts, pijn of benauwdheid, moet u direct contact opnemen met Franciscus Gasthuis of Vlietland. De informatie kunt u terugvinden op bladzijde twee van deze folder.

Uitslag

Het kan zijn dat de longarts die het onderzoek uitvoert, u tijdens of na het onderzoek iets vertelt over zijn bevindingen. Vaak moet echter eerst het laboratoriumonderzoek worden afgewacht. Uw behandelend arts bespreekt het onderzoek met u wanneer de uitslag bekend is.

Vragen

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen het onderzoek tegemoet gaat. Als u nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen.

- Afdeling Endoscopie,
via telefoonnummer **010 - 893 0000**
- Polikliniek Longgeneeskunde,
via telefoonnummer **010 - 461 6800**
BeterDichtbij app
- Polikliniek Oncologiecentrum
Via telefoonnummer **010 - 893 1476**
BeterDichtbij app
poli-oncologiecentrum@franciscus.nl

Als u bent opgenomen op de verpleegafdeling, kunt u altijd uw verpleegkundige om informatie vragen.

Juni 2023
17791