

KANTELTEST

Inleiding

Uw behandelend arts heeft een Kanteltest-onderzoek voor u aangevraagd. In deze folder lees u meer over dit onderzoek.

Let op: lees deze folder goed door!

Het onderzoek

Dit onderzoek wordt bij u gedaan, omdat u regelmatig flauwvalt of duizelig bent. Met behulp van een kanteltest-onderzoek worden uw klachten uitgelokt. Op die manier hopen wij te achterhalen wat de oorzaak is van uw klachten.

Ons lichaam regelt de bloeddruk zonder dat we hierover hoeven na te denken, dit gaat anders gezegd 'vanzelf'. Als dit niet vanzelf goed werkt, dan kan de bloeddruk juist opeens dalen. Een lage bloeddruk zorgt vaak voor duizeligheid en soms zelfs wegrakingen.

Tijdens de kanteltest onderzoek wij hoe uw bloeddruk reageert in verschillende situaties. Tegelijkertijd meten wij uw hersenactiviteit. Op die manier kunnen wij zien of een verandering in hersenactiviteit de oorzaak is van uw klachten.

Tijdens de voorbereiding van dit onderzoek krijgt u een soort badmuts op uw hoofd waar elektroden in zitten. Om ervoor te zorgen dat de elektroden goed contact maken, wordt een zoutpasta tussen de huid en elektroden aangebracht en met een stomp naaldje wat gekrabbeld. Dit is enigszins gevoelig. Verder krijgt u plakkers op de borst waarmee uw hartslag wordt gemeten. Ook krijgt u een bloeddrukmeter om uw bovenarm en plaatsen wij er eentje op uw vinger. Hierdoor worden de actuele bloeddruk continu gemeten. Om ervoor te zorgen dat u niet van het bed valt, bevestigen wij ook een tweetal veiligheidsbanden om uw borst en benen.

Zodra de meting loopt wordt het bed schuin omhoog gekanteld. Deze positie kan zeker 20 minuten duren. Het is hierbij belangrijk dat u zelf aangeeft of u klachten krijgt en deze herkent. Mocht u flauwvallen dan kantelen wij de tafel meteen weer terug.

Heeft u na 20 minuten nog steeds geen herkenbare klachten? Dan krijgt u, in overleg met uw neuroloog, een spray met nitroglycerine onder uw tong. Dit medicijn is een veelgebruikte vaatverwijder en helpt bij het activeren van uw klachten. Deze spray heeft een pepermuntsmaak. Eventuele bijwerkingen zijn: blozen, warm of hoofdpijn krijgen. Dit duurt maar kort. Zodra het medicijn is uitgewerkt, verdwijnen de bijwerkingen weer.

Algemene informatie over het onderzoek

Het totale onderzoek duurt ongeveer 75-90 minuten.

U wordt voor dit onderzoek verwacht op de afdeling Klinische Neurofysiologie in Franciscus Vlietland (Schiedam). U meldt zich op de 1^e verdieping bij balie 25.

Vorbereiding

- Was uw haar de dag vóór het onderzoek goed.
- Gebruik geen haarproducten. Bijvoorbeeld vet, gel, lak of crème. Dit zorgt voor storingen tijdens het onderzoek.
- Hoofdbedekking, haarwerken, haartoevoegingen, haar-extensions en pruiken zullen tijdens het onderzoek af moeten.
- Zorg voor warme handen (de bloeddrukmeter kan geen bloeddruk meten bij koude handen).
- Neem iemand mee die uw klachten herkent. Denk bijvoorbeeld aan uw partner of ouder. Zij blijven tijdens het onderzoek bij u.
- Vul de digitale vragenlijst in die voor u is klaargezet in uw patiëntenportaal; dit geeft ons een beter beeld van uw klachten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van uw specialist op de polikliniek.

Vragen en contact

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur met de afdeling Klinische Neurofysiologie via 010 – 893 1632 of polikliniek Neurologie via 010 – 893 1610.

Let op!

Bent u verhinderd? Neemt u dan ruim van te voren (tenminste 24 uur) contact met ons op. Kom op tijd! Als u meer dan 15 minuten te laat voor uw afspraak bent, gaat het onderzoek niet door!

Juli 2023