



LONGFUNCTIEONDERZOEK

AANVRAAG VIA DE HUISARTS

Wat is een longfunctieonderzoek?

Met een longfunctieonderzoek controleren we hoe uw longen en luchtwegen werken. Er zijn verschillende soorten onderzoeken. In deze folder leest u welk onderzoek u krijgt en hoe dit onderzoek verloopt.

Spirometrie

Voor deze test blaast u met uw mond krachtig door een apparaat. Hierbij zit er een knijper op uw neus. De oefeningen wordt een aantal keer herhaald.

Hierna krijgt u een medicijn dat de luchtwegen kan verwijden. Als dit medicijn na 10-15 minuten is ingewerkt, blaast u met uw mond krachtig door een apparaat. Ook deze oefeningen doen we een aantal keer.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Voorbereiding

Wij vragen u om op de dag van het onderzoek niet te zwaar in te spannen, zoals sporten.

Als u bekend bent met benauwdheid na inspanning, raden wij u aan om 15 minuten voor uw afspraak aanwezig te zijn. Zo kunt u nog even rustig bijkomen voor het onderzoek begint.

Inschrijven

Bent u nog niet ingeschreven in ons ziekenhuis, of zijn uw gegevens gewijzigd? Loop dan vóór uw afspraak langs de inschrijfbalie.

Medicijnen

Als u medicatie gebruikt voor uw luchtwegen moet u deze volgens onderstaand schema staken:

48 uur vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Anoro	Umeclidinium + Vilanterol
Duaklir genuair	Aclidinium + Formoterol
Hirobriz	Indacaterol
Incruse	Umeclidinium
Onbrez	Indacaterol
Relvar	Vilanterol + Fluticasonfioraat
Seebri	Glycopyrronium
Spiolto	Tiotropium + Indacaterol
Spiriva	Tiotropium
Striverdi	Olodaterol
Tiotrus	Tiotropium
Tovanor	Glycopyrronium
Trelegy ellipta	Fluticason + Umeclidinium
Trimbow	Beclometason + Formoterol + Glycopyrronium
Ultibro	Indacaterol + Glycopyrronium
Xoterna	Indacaterol + Glycopyrronium

24 uur vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Aerivio	Salmeterol + Fluticason
Airflusal	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bretaris genuair	Alcidinium
Bufoler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Budesonide + Salmeterol
Duoresp	Formoterol + Budesonide
Elkira genuair	Alcidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclometason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Singulair	Montelukast
Symbicort	Formoterol + Budesonide

8 uur vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Airomir	Salbutamol
Atrovent	Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium
Bricanyl	Terbutaline
Combivent	Salbutamol + Ipratropium
Ipramol	Salbutamol + Ipratropium
Ipraxa	Ipratropium
Salamol	Salbutamol
Ventolin	Salbutamol

Heeft u pas via uw huisarts een prednison- en/of antibioticakuur voor uw longen gekregen? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde om te vragen of het onderzoek door kan gaan.

Heeft u afgelopen 8 weken een operatie gehad aan uw oog, borstkas of buik? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde om het onderzoek te verplaatsen.

Uitslag

Uw huisarts krijgt de uitslag van het onderzoek opgestuurd en bespreekt met u het resultaat.

Heeft u vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer 010 – 461 6800.

Kunt u niet op de afgesproken tijd komen, wilt u dan minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of verzetten?

Februari 2025