

AANBRENGEN VAN EEN STENT IN DE NIER

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

U hebt een afspraak gemaakt voor het inbrengen van een stent (een soort buisje) in de nier. Het inbrengen van een dubbel J katheter is alleen nodig als de doorgang tussen de nier en de blaas verhinderd wordt. We spreken dan van obstructie.

In deze folder vindt u aanwijzingen over hoe u zich op het onderzoek moet voorbereiden. Voor het slagen van het onderzoek is het van groot belang dat u zich aan deze aanwijzingen houdt. Tevens vindt u in deze folder informatie over het verloop van het onderzoek.

Vorbereiding

Heeft de uroloog u medicijnen (antibiotica) voorgeschreven, dan start u hiermee één dag vóór het onderzoek. De antibiotica beschermen u tegen mogelijke infecties. Maakt u vooral de antibioticakuur af, ook als u nadien geen enkele klacht hebt.

Waar melden

U meldt zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek urologie. De assistente roept u binnen als u aan de beurt bent.

Het onderzoek

De uroloog verricht het onderzoek in samenwerking met een radiodiagnostisch laborant en een assistent.

Wij vragen u op de röntgentafel te gaan liggen met uw benen in de twee beensteunen, die op de röntgentafel gemonteerd zijn. De assistent desinfecteert nu de uitgang van de plasbuis en spuit bij mannen wat glijmiddel in het urinekanaal. Dit kan een beetje branderig aanvoelen. In dit glijmiddel zit ook een verdovende stof. Daarna wordt het onderlichaam met steriele doeken afgedekt.

De uroloog brengt een metalen buisje, een cystoscoop, via de plasbuis in de blaas. Probeert u zich, bij het inbrengen van het buisje, zoveel mogelijk te ontspannen. Vervolgens wordt de blaas, door het ingebrachte buisje, gevuld met water. Hierdoor kunt een gevoel van aandrang krijgen. Laat het de uroloog weten, als deze aandrang te groot wordt.

De blaas heeft zich nu ontplooid en de uroloog kan kleine openingen op de blaasbodem zien. Deze kleine openingen leiden naar de linker en de rechter nier. De uroloog brengt een dun slangetje in zo'n kleine opening, spuit de afvoerbuis op met contrastvloeistof en brengt een voerdraad in tot in de nier. U kunt dit als een prik ervaren. Blijft u vooral rustig liggen.

De uroloog verwijdert het slangetje en brengt de stent via de voerdraad in, meestal onder röntgendoorlichting. Zonodig worden er foto's gemaakt. Vervolgens wordt de voerdraad verwijderd en is de behandeling klaar.



De stent kan zo nodig zes maanden blijven zitten.

Röntgenstraling

Bij de behandeling maken wij gebruik van röntgenstraling. De uiterst moderne apparatuur stelt ons in staat zeer zorgvuldig om te gaan met de toe te dienen straling.

De enige uitzondering hierop is als u zwanger bent

Zwangerschap, blaasontsteking of ongesteldheid

Indien u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, neem dan van tevoren telefonisch contact op met onze afdeling. Het is namelijk niet verstandig de ongeboren baby aan deze straling bloot te stellen. Het onderzoek moet worden uitgesteld. Vervolgens vindt het onderzoek plaats binnen tien dagen na de eerste dag van de menstruatie. Verzet zo nodig uw afspraak.

Als u denkt dat u een blaasontsteking hebt, is het noodzakelijk dat u dit van tevoren meldt aan de uroloog of de assistent(e) van de uroloog. Bij een blaasontsteking wordt het onderzoek uitgesteld.

Wanneer u ongesteld bent, mag u het onderzoek uitstellen, het hoeft niet.

Na het onderzoek

Het komt soms voor dat u na het onderzoek een branderig gevoel hebt bij het plassen. Dit heeft te maken met de cytoscoop die is ingebracht om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Nadat u enkele keren plassen zijn deze klachten over.

Tevens kunnen zich enige tijd na het onderzoek bloedsporen in de urine bevinden. Dit kan rood gekleurde urine zijn, maar er kunnen zich ook kleine bloedstolseltjes in de urine bevinden. Maakt u zich hierover niet ongerust, dit moet na enige keren te hebben geplast verdwenen zijn, Mocht dit niet het geval zijn, aarzelt u dan niet om met ons contact op te nemen. We adviseren u goed te drinken na het onderzoek.

Vragen

In deze folder hebben we alleen de meest belangrijke vragen beantwoord. Als iets u niet duidelijk is, vraagt u dit dan aan de assistent. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de polikliniek urologie, via telefoon 010 - 893 0000.