



**AFSPRAKEN VOOR OPERATIES  
BIJ PATIËNTEN MET DIABETES  
(SUIKERZIEKTE)**

---

U wordt binnenkort geopereerd. Aangezien u diabetes (suikerziekte) heeft, vindt u hieronder belangrijke informatie.

Als u bloedsuikerverlagende tabletten of (wekelijkse) injecties gebruikt:

- De week voor uw operatie stopt u de wekelijkse injectie van **Dulaglutide, Semaglutide of Tirzepatide**
- Drie dagen voor de operatie stopt u met de volgende tabletten: **Canagliflozine, Empagliflozine, Dapagliflozine, Ertugliflozine.**
- De avond voor de operatie kunt u wel eten en kunt u wel uw **bloedsuikerverlagende tabletten** gebruiken, behalve **Semaglutide.**
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen:
  - Tot 2 uur voor opname heldere vloeistoffen,
  - Tot 6 uur voor opname eventueel een licht ontbijt (zie folder: 'Vorbereiding op uw operatie').
- De ochtend van de operatie mag u geen **bloedsuikerverlagende tabletten** gebruiken. Ook de **Semaglutide** of dagelijkse injectie **Liraglutide of Lixisenatide** slaat u over.
- Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

Als u insuline spuit:

- De avond voor de operatie kunt u wel eten en kunt u wel uw **kortwerkende insuline** spuiten.
- Op de avond vóór en de ochtend van de operatie moet u  $\frac{3}{4}$  deel (=75%) van uw normale dosering **langwerkende insuline** spuiten (zoals **Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal**).
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen:
  - Tot 2 uur voor opname heldere vloeistoffen,
  - Tot 6 uur voor opname eventueel een licht ontbijt (zie folder: 'Vorbereiding op uw operatie').
- Op de ochtend van de operatie mag u geen **kortwerkende insuline** of een **mix-insuline** spuiten.
- Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

Als u bloedsuikerverlagende tabletten gebruikt én insuline spuit:

- De week voor uw operatie stopt u de wekelijkse injectie van **Dulaglutide, Semaglutide of Tirzepatide**.
- Drie dagen voor de operatie stopt u met de volgende tabletten: **Canagliflozine, Empagliflozine, Dapagliflozine, Ertugliflozine**.
- De avond voor de operatie kunt u wel eten en kunt u wel uw **kortwerkende insuline** en **bloedsuikerverlagende tabletten** gebruiken, behalve **Semaglutide**
- Op de avond vóór en de ochtend van de operatie moet u  $\frac{3}{4}$  deel (=75%) van uw normale dosering **langwerkende insuline** spuiten (zoals **Lantus, Levemir, Insulatard, Humuline NPH of Insuman Basal**).
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen:
  - Tot 2 uur voor opname heldere vloeistoffen,
  - Tot 6 uur voor opname eventueel een licht ontbijt (zie folder: 'Vorbereitung op uw operatie').
- De ochtend van de operatie mag u geen **bloedsuikerverlagende tabletten** gebruiken.
- Ook de **Semaglutide** of dagelijkse injectie **Liraglutide of Lixisenatide** slaat u over op de ochtend van de operatie.
- Op de ochtend van de operatie mag u geen **kortwerkende insuline** of een **mix-insuline** spuiten.
- Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

Patiënten die een insulinepomp gebruiken:

- De avond voor de operatie kunt u wel eten en wel uw insulinepomp gebruiken.
- De ochtend van de operatie mag u alleen nog eten en drinken volgens de richtlijnen:
  - Tot 2 uur voor opname heldere vloeistoffen,
  - Tot 6 uur voor opname eventueel een licht ontbijt (zie folder: 'Vorbereitung op uw operatie').
- Op de ochtend van de operatie moet u de basisstand van uw insulinepomp verlagen naar  $\frac{3}{4}$  van de normale dosering (=75%) en dient u zichzelf geen extra bolussen toe.

- Heeft u een zelfregulerende insulinepomp, dan overlegt u met uw eigen diabetesverpleegkundige over de aanpassing voor de operatie.
- Bij een hypo-gevoel kunt u een glas heldere appelsap drinken of een tablet Dextro Energy nemen.

In het ziekenhuis wordt het bloedsuikergehalte regelmatig gemeten. Als het nodig is krijgt u een infuus met glucose en insuline aangesloten.

## **Vragen**

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u maandag tot vrijdag tussen 8.00-12.00 uur en 13.00-16.30 uur telefonisch contact opnemen met de Preoperatieve screening.

Franciscus Gasthuis (Rotterdam): 010 – 461 6410

Franciscus Vlietland (Schiedam): 010 – 893 1960

*April 2025*  
*1153*