

BEADEMING IN BUIKLIGGING

Inleiding

Uw familielid of naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care. Er is besloten om de patiënt te beademen in buikligging. In deze folder leest u meer over deze behandeling.

Beademing in buikligging

De ondersteuning van de ademhaling via de beademingsmachine is op dit moment niet voldoende. Daarom wordt de patiënt op zijn of haar buik gedraaid. Dankzij deze houding kan het onderste deel van de longen beter functioneren. Ook wordt op deze manier het zuurstof in het lichaam beter opgenomen.

De duur van deze behandeling wisselt van 1 tot meerdere dagen. Dit hangt af van het herstel van de longen. Als buikligging meerdere dagen nodig is, dan wordt dit met rugligging afgewisseld. De arts beoordeelt de duur van de buikligging en wanneer terugdraaien op de rug nodig is.

In slaap

Patiënten die op hun buik liggen zijn ernstig ziek. Het IC-team zorgt dat de patiënt daar zo min mogelijk van merkt. Daarom wordt slaapmedicatie gegeven tijdens het draaien en in de periode dat de patiënt op de buik ligt. Het gevolg is wel dat u daardoor tijdelijk geen contact met de patiënt hebt. U mag de patiënt wel gewoon aanraken en tegen hem/haar praten.

Verzorging

Als de patiënt op zijn rug ligt, dan wordt het gezicht goed verzorgd. Om de ogen te beschermen tegen uitdroging worden ze afgeplakt. Wanneer de patiënt op zijn buik ligt (buikligging), is het gezicht niet goed zichtbaar. Door vochtophoping kan er een zwelling in het gezicht en de hals ontstaan. Dit zorgt ervoor dat de patiënt er wat anders uitziet dan u bent gewend. Dit trekt na enige tijd weg, zodra de patiënt weer op zijn rug ligt.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u deze gerust stellen aan de verpleegkundige die de zorg draagt voor de patiënt. U kunt ze ook stellen aan de arts tijdens een familiegesprek.