

BEHANDELING BIJ IJZERTEKORT
TIJDENS UW ZWANGERSCHAP

Inleiding

Uw arts heeft u een behandeling met een Ferinject-infuus voorgeschreven. Ferinject is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van ijzertekort. Het is een middel voor het behandelen van ijzertekort. In deze folder leest u meer over de behandeling.

Wat is een Ferinject-infuus?

Ferinject is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor het behandelen van ijzertekort. Dit betekent dat er niet genoeg ijzer in uw lichaam aanwezig is. IJzer is een erg belangrijke bouwstof voor het lichaam en zorgt voor de zuurstofvervoer naar onder andere uw organen en spieren. De arts schrijft dit middel voor als:

- Bij ernstige ijzertekort;
- Als patiënten ijzertabletten niet kunnen verdragen, niet mogen gebruiken of onvoldoende werken.

Zwangerschap en Ferinject-infuus

In het tweede en derde trimester van uw zwangerschap kan een Ferinject veilig worden toegediend. Ook tijdens het geven van borstvoeding kan dit middel veilig worden gegeven.

Geef het aan uw arts aan indien u:

- Allergisch bent;
- Eerdere allergische reacties hebt gehad bij ijzermedicatie of er een ijzerstapeling (teveel ijzer in uw lichaam);
- Als er een stoornis aanwezig is.

Vorbereidingen

Voor de behandeling met dit medicijn hoeft u geen voorbereidingen te doen.

De behandeling

Het toedienen van het Ferinject-infuus gebeurt tijdens een korte opname op de Dagbehandeling. Hier krijgt u het medicijn via een infuus in een bloedvat in uw arm. De dosering is 1000 mg en het medicijn is bruin van kleur. De totale duur van de behandeling is ongeveer 1 uur. Het duurt ongeveer 30 minuten voor het medicijn helemaal in uw lichaam zit. Hierna blijft u nog ongeveer 30 minuten op de Dagbehandeling ter observatie. Als

de metingen goed zijn en u geen last heeft van extreme klachten, kunt u het ziekenhuis zelfstandig verlaten. De meeste patiënten merken het effect van de behandeling met Ferinject na ongeveer 1 tot 2 weken. Verdere afspraken zullen met de arts, gynaecoloog of (klinisch) verloskundige gemaakt worden.

Na de behandeling

Na de behandeling mag u weer naar huis. Het medicijn beïnvloedt niet uw rijvaardigheid. U mag na de behandeling zelf autorijden. In overleg met uw arts kunt u stoppen met de inname van de ijzertabletten. U zult na ongeveer 8 dagen het resultaat van de behandeling merken. De klachten die u door het ijzertekort had, zullen verminderen en/of verdwijnen.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals vele medicijnen, kan ook Ferinject-infuus verschillende klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld:

- Hoofdpijn;
- Duizeligheid;
- Metaalsmaak in de mond;
- Misselijk;
- Verstopping of juist diarree;
- Uitslag op de huid;
- Reactie op de prikplaats;
- Buikpijn.

Vragen?

Het kan zijn dat u na het lezen van deze folder nog vragen heeft. U kunt ons dan gerust bellen: Maandag t/m vrijdag tussen 08.00 uur en 16.30 uur via 010 – 461 6202.