

CAUDAAL KATHETER

FRANCISCUS GASTHUIS

Inleiding

Na rugoperaties kan in het wervelkanaal littekenweefsel ontstaan. Dit littekenweefsel kan op zenuwen drukken of zenuwen beknellen, met uitstralende pijn als gevolg. Deze pijn kunnen we bestrijden met een caudaal katheter. In deze folder leest u hier meer over.

Doel van de behandeling

Het doel van deze behandeling is om pijn te verminderen door het littekenweefsel te versoepelen, zodat de zenuw minder geïrriteerd wordt, waardoor de pijn afneemt.

Voor de behandeling

1. Wanneer u bloedverdunners gebruikt, kunt u deze meestal gewoon innemen. U krijgt van uw specialist te horen of u deze kunt blijven slikken of dat u moet stoppen. Moet u stoppen met de bloedverdunners, neemt u deze dan vijf dagen van tevoren niet meer in.
2. Hebt u een allergie voor medicijnen of contrastvloeistof, meld dit dan voorafgaand aan de ingreep.
3. Hebt u algemene ziekteverschijnselen, zoals koorts, hoesten of benauwdheid? Neemt u dan contact op met de polikliniek Pijnbestrijding.
4. U mag na de behandeling niet zelf naar huis rijden en ook niet alleen reizen met het openbaar vervoer. Laat u dus ophalen door iemand die u met de auto naar huis brengt of die u begeleidt in het openbaar vervoer.
5. Voor vrouwen: bent u zwanger of vermoedt u dat u zwanger bent, dan kan de behandeling niet doorgaan. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen wordt gewerkt.

Behandeling

De opnameduur van deze behandeling is drie dagen. U meldt zich op de afdeling Orthopedie, het tijdstip wordt nog met u afgesproken. Daar wordt u opgenomen en krijgt u een infuusnaaldje in. Op de polikliniek Pijnbestrijding krijgt u eerst antibiotica via het infuus door het naaldje. U gaat op uw linkerzijde liggen, waarna uw stuitje wordt aangeprikt.

Vervolgens wordt de stuit gedesinfecteerd. De pijnspecialist dekt de plaats af met een steriele doek.

Bij deze behandeling wordt een zeer dun slangetje (katheter) via het stuitje, het einde van het wervelkanaal, ingebracht. Er wordt eerst een plaatselijk verdovend middel door de katheter gespoten, waardoor een verdoofd gevoel in uw billen ontstaat. Nadat gecontroleerd is of de katheter goed zit, krijgt u de eigenlijke medicatie ingespoten.

Deze medicatie bestaat uit een ontstekingsremmer, een verdoving en een medicijn, waardoor het littekenweefsel versoepelt/vermindert.

Hierna moet u zeker tot 18.00 uur in bed blijven. Uw bloeddruk wordt regelmatig gemeten. De volgende dag wordt deze behandeling herhaald. De derde dag wordt de behandeling herhaald, maar dan zonder de verdoving. U mag dan om 12.00 uur naar huis. U krijgt een telefonische afspraak mee.

Bijwerking

De eerste twee dagen na inspuiting van de medicijnen, kan een zwaar gevoel in uw benen optreden. U kunt door de verdoving ook problemen krijgen met plassen. Dit verdwijnt vanzelf als de verdoving weer uitwerkt. U wordt eventueel eenmalig gekatheteriseerd.

Bij patiënten met diabetes kan gedurende enkele dagen de bloedsuikerspiegel verhoogd zijn.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de Pijnpolikliniek, via telefoonnummer 010 – 461 6674.