

CAUDALE INJECTIE

FRANCISCUS GASTHUIS

Inleiding

De caudale injectie is een injectie die onderaan de wervelkolom, in de stuit, wordt gegeven. Patiënten die in het verleden aan de onderrug zijn geopereerd of op hun stuitje zijn gevallen, komen hier vaak voor in aanmerking.



Caudale injectie in het stuitje

Voor de behandeling

1. Wanneer u bloedverdunders gebruikt, kunt u deze meestal gewoon innemen. U krijgt van uw specialist te horen of u deze kunt blijven slikken of dat u moet stoppen. Moet u stoppen met de bloedverdunders, neemt u deze dan vijf dagen van tevoren niet meer in.
2. Hebt u een allergie voor medicijnen of contrastvloeistof, meld dit dan voorafgaand aan de ingreep.
3. Hebt u algemene ziekteverschijnselen, zoals koorts, hoesten of benauwdheid? Neemt u dan contact op met de polikliniek Pijnbestrijding.
4. Voor vrouwen: bent u zwanger of vermoedt u dat zwanger bent, dan kan de behandeling niet door gaan. De reden hiervoor is dat er tijdens de behandeling met röntgenstralen wordt gewerkt.
5. U mag niet zelf naar huis rijden en ook niet alleen reizen met het openbaar vervoer. Laat u dus ophalen door iemand die u met de auto naar huis brengt of die u begeleidt in het openbaar vervoer. Dus: u mag wel alleen komen, maar u mag niet alleen weg.
6. Het bezoek blijft voor, tijdens en na de behandeling niet op de zaal, maar op de gang, in de wachtruimte of ergens anders.

De behandeling

Op de dag van de behandeling meldt u zich op de polikliniek Pijnbestrijding. De tijd staat op uw kaartje.

U trekt gemakkelijk zittende kleding aan. Afhankelijk of u 's morgens of 's middags behandeld wordt, mag u een licht ontbijt of een lichte lunch.

Om de plaats van de naald goed te bepalen, vindt deze behandeling plaats met behulp van röntgenstralen.

Wanneer u binnenkomt, gaat u op de röntgentafel liggen op uw linkerzijde, met uw knieën opgetrokken naar uw neus. Vervolgens wordt de stuit gedesinfecteerd. Staat de naald goed, dan wordt de medicatie ingespoten. Dit kan een drukkend, opgeblazen gevoel geven.

Na de behandeling ligt u op bed of zit u op een stoel. U blijft ongeveer een uur in het ziekenhuis. Zodra u naar huis gaat, krijgt u van ons een controleafspraak mee.

Mogelijke bijwerkingen en complicaties

De injectie geeft mogelijk bijwerkingen:

- een doof gevoel in uw benen of schaamstreek;
- krachtsvermindering in de benen en/of voeten;
- bij heren: eventueel moeite met urineren.

Deze bijwerkingen verdwijnen na enige uren, als de verdoving is uitgewerkt.

Vrouwen kunnen opvliegers krijgen en de menstruatie kan korte tijd verstoord zijn. Bij patiënten met diabetes kan gedurende enkele dagen de bloedsuikerspiegel verhoogd zijn.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch contact opnemen met de polikliniek Pijnbestrijding via telefoonnummer 010 – 461 6674.