

CHIRURGISCHE INGREEP

POLIKLINISCH

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

Binnenkort wordt u in ons ziekenhuis behandeld voor een kleine ingreep. De ingreep wordt uitgevoerd door een chirurg of een plastisch chirurg.

In deze folder staat de gang van zaken bij deze behandeling beschreven. De adviezen zijn bedoeld om een voorspoedig verloop van de behandeling te bevorderen. Wanneer u weet wat er gaat gebeuren, kunt u zich beter voorbereiden op de ingreep.

Vorbereiding

U hoeft zich niet speciaal voor te bereiden op de behandeling. U kunt normaal eten en drinken.

Ingrepen met plaatselijke verdoving

Het verwijderen van moedervlekken

Moedervlekken (naevi) zijn goedaardige opeenhopingen van pigmentvormende cellen in de huid.

Lipomen

Een lipoom is een goedaardig gezwel van vetweefselcellen. Deze gezwellen hebben de vorm van een ronde, soms pijnlijke, ovale bultjes onder de huid. Ze variëren in grootte.

Talgkliercyste

Een atheroomcyste of talgkliercyste is een holte in de huid. Deze ontstaat als de normale uitgang van een afvoergang van een haarfollikel en de bijbehorende talgklier afgesloten raakt. De cyste heeft een ronde tot ovale vorm in de huid. Meestal zit een kleine verstopte porie midden op de zwelling.

Huidgezwollen

Het verwijderen van oneffen plekjes op de huid die huidkanker kunnen zijn. Deze zijn er in verschillende typen.

De behandeling

De behandeling vindt plaats in de poliklinische operatiekamer.

Tijdens de behandeling ligt u op een behandeltafel. Vooraf wordt de te opereren plaats met alcohol of jodium zoveel mogelijk bacterievrij gemaakt en krijgt u een prik om de plaats te verdoven.

Tijdens de ingreep wordt de te opereren plaats afgedekt met steriele blauwe doeken.

De wond wordt na de ingreep gehecht en verbonden met een pleister of een verband. Dit is afhankelijk van de soort behandeling.

Na de behandeling

Als de behandeling klaar is krijgt u nog enkele adviezen van de specialist of de assistente. Tevens krijgt u een nieuwe afspraak. Indien nodig krijgt u een pijnstiller of recept mee.

Naar huis

Als u aan een hand of voet wordt geholpen, is het verstandig om niet zelf naar huis te rijden. In de meeste andere gevallen kunt u zelfstandig naar huis gaan.

Weer thuis

Wanneer de verdoving is uitgewerkt kan er enige wondpijn ontstaan. U kunt dan een pijnstiller innemen.

Vragen

We kunnen in deze folder alleen de meest voor de hand liggende vragen beantwoorden. Als iets u niet duidelijk is, neemt u dan contact op met de polikliniek chirurgie of plastische chirurgie telefoon 010 893 00 00.