

franciscus

MANOMETRIE

ONDERZOEK VAN DE SLOKDARM

De arts heeft met u besproken dat u een slokdarmonderzoek krijgt. In deze folder geven wij u informatie over dit onderzoek.

Let op!

- Kunt u niet op de afgesproken tijd komen? Annuleer of verzet uw afspraak minimaal 48 uur van tevoren. Anders moeten we de kosten van het onderzoek in rekening te brengen.
- Het is niet toegestaan om iemand mee te nemen in de onderzoekskamer. Heeft u moeite met de Nederlandse taal? Dan mag er wel iemand mee. Uw contactpersoon mag het onderzoek voor u vertalen.

Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij de Inschrijfbalie op de begane grond.

Wat is manometrie?

Manometrie is een drukmeting in de slokdarm. Met dit onderzoek kunnen we de bewegingen van de slokdarm onderzoeken. De druk wordt gemeten via een slangetje (katheter of sonde), waarin drukmeters zitten. Dit slangetje wordt via uw neus in uw slokdarm gebracht. De knijpkracht van de spieren, en ook eventuele verkrampingen, kunnen op deze manier gemeten worden.

Vorbereiding thuis

Het is erg belangrijk dat u voor het onderzoek **NIET** eet, drinkt en/of rookt. Doet u dit wel? Dan kan het onderzoek niet worden uitgevoerd. Bekijk dit schema heel goed!

Tijd:	Toegestaan:
Tot 6 uur voor het onderzoek mag u een lichte maaltijd eten. Hierna mag u NIET meer eten .	Lichte maaltijd: Maximaal 2 beschuitjes of 1 witte boterham met jam of suiker en dun gesmeerde margarine of halvarine. Een glas melk en koffie met melk en/of suiker is toegestaan. Hiernaast kunt u heldere dranken drinken. Deze staan hieronder vermeld.
Tot 2 uur voor het onderzoek mag u heldere dranken drinken. Hierna mag u NIET meer drinken .	Heldere dranken: <ul style="list-style-type: none">▪ Heldere bouillon (zonder vlees).▪ Koffie en thee zonder melk, zoetstof of sorbitol.▪ Helder vruchtensap (appelsap/witte druivensap/vruchtenmix siroop).▪ Water (niet koolzuurhoudend) eventueel met limonadesiroop zonder sorbitol.

Rookt u? Dan mag u vanaf de avond (18.00 uur) voor het onderzoek niet meer roken.

Het onderzoek

- De verpleegkundige brengt een verdovende gel aan op de katheter of sonde. De verpleegkundige brengt via de neus de katheter of sonde in tot in de keel. Hierna wordt u gevraagd uw kin op de borst te drukken en te slikken. U krijgt hierbij wat water, zodat u gemakkelijker kunt slikken.
- De verpleegkundige bepaalt de juiste positie van de katheter of sonde in de slokdarm met behulp van de gegevens op de computer.
- Hierna start de drukmeting. De verpleegkundige spuit een aantal keer wat water in uw mond. Hierna moet u dit water doorslikken. Dit wordt ongeveer 10 keer herhaald.
- Hierna wordt het slangetje weer verwijderd

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt gemiddeld 30 minuten.

Na het onderzoek

- De verdovende gel kan tijdelijk minder gevoel in de keel geven. Na een half uur is dit uitgewerkt en kunt u weer normaal eten en drinken.
- Uw keel kan nog pijnlijk en rauw aanvoelen. Dit verdwijnt meestal binnen 24 uur.

Mogelijke complicaties

Dit is een veilig onderzoek. Er komen vrijwel nooit complicaties voor.

Vragen

Wij hopen dat u na het lezen van deze folder met vertrouwen het onderzoek tegemoet gaat. Als u nog vragen heeft, kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur telefonisch contact opnemen via 010 – 461 6173 (Franciscus Gasthuis) of 010 - 893 1311 (Franciscus Vlietland).