



HISTAMINEPROVOCATIETEST

De longfunctieanalist voert binnenkort een histamineprovocatietest bij u uit. In deze folder leest u meer over dit onderzoek.

Vorbereiding

In de volgende tabellen staan de medicijnen die u niet mag gebruiken in de voorbereiding op het onderzoek. Het is noodzakelijk dat u tijdelijk met deze medicatie stopt.

Wanneer het u niet lukt om de medicatie tijdelijk te staken, of u heeft per ongeluk uw medicatie gebruikt, dan kan het onderzoek niet doorgaan. Wij vragen u vriendelijk dan contact op te nemen met de polikliniek Longgeneeskunde. De contactgegevens staan verderop in deze folder.

1 week vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Anoro	Umeclidinium + Vilanterol
Incruse Ellipta	Umeclidinium
Seebri	Glycopyrronium
Spiriva	Tiotropium
Spiolto	Tiotropium + Olodaterol
Tiotrus Zondra	Tiotropium
Xoterna	Indacaterol + Glycopyrronium
Ultibro	Indacaterol + Glycopyrronium
Trimbow	Beclomethasondipropionaat + Formoter + Olfumaraatdihydraat + Glycopyrronium
Trelegly Ellipta	Fluticason + Vilanterol + Umeclidinium

48 uur vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Daxas	Roflumilast, actieve metaboliet
Onbrez	Indacaterol
Relvar Ellipta	Fluticasofuroaat + Vilanterol
Striverdi	Olodaterol
Theolair Retard	Theofylline
Unilair	Theofylline

36 uur vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
AirFluSal Forspiro	Salmeterol + Fluticason
Aerivo	Salmeterol + Fluticason
Atimos	Formoterol
Bufoler Easyhaler	Formoterol + Budesonide
Busalair	Salmeterol + Budesonide
Duaklir Genuair	Aclidinium + Formoterol
DuoResp Spiromax	Formoterol + Budesonide
Elpenhaler	Salmeterol + Fluticason
Eklira Genuair	Aclidinium
Flutiform	Formoterol + Fluticason
Foradil	Formoterol
Foster	Formoterol + Beclomethason
Oxis	Formoterol
Seretide	Salmeterol + Fluticason
Serevent	Salmeterol
Symbicort	Formoterol + Budesonide
Singulair	Montelukast
Semprex	Acrivastine

12 uur vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Atrovent	Ipratropium
Combivent	Salbutamol + Ipratropium
Berodual	Fenoterol + Ipratropium

6 uur vóór het onderzoek stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Airomir	Salbutamol
Bricanyl	Terbutaline
Ventolin	Salbutamol

LET OP: Stop 72 uur (3 dagen) voor de afspraak met uw allergiemedicatie (antihistaminica en/of Montelukast).

Het is niet nodig om te stoppen met:

Merknaam	Naam van het medicijn
Alvesco	Ciclesonide
Flixotide	Fluticasonpropionaat
Pulmicort	Budesonide
Qvar	Beclomethason

Luchtweginfectie

Heeft u via uw huisarts een prednison- en/of antibioticakuur voor uw longen gekregen en gebruikt u deze nog op de dag van het onderzoek? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde om het onderzoek te verplaatsen.

Operatie

Heeft u afgelopen 8 weken een operatie gehad aan uw oog, borstkas of buik en heeft u hierdoor nog beperkingen qua inspanning? Neem dan contact op met de polikliniek Longgeneeskunde om het onderzoek te verplaatsen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of denkt u zwanger te zijn? Dan kan het onderzoek niet doorgaan. Bij het geven van borstvoeding kan het onderzoek ook niet doorgaan. Neem contact op met de polikliniek om het onderzoek te annuleren.

Kinderen en naasten of begeleiders

Wij willen u er vriendelijk op wijzen dat wegens veiligheidsoverwegingen kinderen niet zijn toegestaan in de onderzoekskamer. Ook naasten of eventuele begeleiders die last hebben van de luchtwegen zijn niet toegestaan.

Het onderzoek

Bij dit onderzoek meet de longfunctieanalist de prikkelbaarheid van de luchtwegen door u histamine te laten inademen. Daarna blaast u een oefening op een apparaat. Dit wordt enkele malen herhaald. Het kan gebeuren dat u tijdens de test wat benauwd wordt of gaat hoesten. U krijgt aan het einde van deze test medicatie die deze klachten vrijwel direct doen verdwijnen. Na

de test kunt u kortdurend last hebben van heesheid en/of keelpijn.

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Heeft u vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen van 8.00 tot 16.30 uur bellen naar de polikliniek Longgeneeskunde via telefoonnummer 010 – 461 6800.

*Juli 2024
17713*