

NA EEN KAAKCHIRURGISCHE BEHANDELING
ENKELE RAADGEVING VOOR UW KIND

FRANCISCUS VLIETLAND

Raadgevingen na een kaakchirurgische behandeling

In deze folder vindt u adviezen over wat u moet doen nadat uw kind aan de kaak geopereerd is. Als u deze adviezen opvolgt is de kans op complicaties het kleinst en verloopt de genezing sneller.

Kort na de operatie

De eerste uren na de behandeling moet uw kind zich lichamelijk niet teveel inspannen, omdat de gewonde bloedvaten zich nog moeten sluiten en er een bloedstolsel moet ontstaan. Door heftige bewegingen kan dit worden verstoord.

Een half uur na de ingreep mag het gaasje, dat als drukverband dient, worden verwijderd.

Uw kind krijgt tijdens de behandeling vaak een lokale verdoving. Hierdoor kan het zijn dat de wang en lip van uw kind verdoofd aanvoelt. Dit kan ongeveer twee uur duren. Let er gedurende deze periode op dat uw kind niet op de lip of de wang bijt.

Wanneer uw kind een kaakchirurgische behandeling heeft ondergaan, is het mogelijk dat uw kind de eerste paar dagen last heeft van nabloeden, een zwelling en pijn. Het is ook mogelijk dat de mond niet goed open gaat.

Kans op complicaties verkleinen en genezing versnellen

Als u zich aan de onderstaande adviezen houdt verkleint u de kans op complicaties en verloopt de genezing sneller.

Spoelen en tanden poetsen

De dag van de behandeling is het **niet** verstandig om de mond van uw kind te spoelen. De wond kan weer gaan bloeden.

Na 24 uur moet uw kind voorzichtig spoelen met lauw, zout water. Dit doet u na elke maaltijd en voor het slapen gaan. In een glas lauw water doet u een halve theelepel zout.

Uw kind kan wel tanden poetsen. Doe dit voorzichtig op de plaats van de operatie

Eten en drinken

Uw kind mag alles eten en drinken, maar zacht voedsel heeft de voorkeur. Warme dranken kunnen er voor zorgen dat de wond weer gaat bloeden. Sla geen maaltijden over.

Wat u zelf kunt doen

Als er toch complicaties ontstaan, kunt u in een aantal gevallen zelf iets doen.

Zwelling

De zwelling kan best groot zijn, maar heeft in het algemeen geen neiging tot ontsteken. Na drie a vier dagen is de zwelling meestal het grootst. Daarnaast kunt u een zwelling verminderen door enkele blokjes ijs in een plastic zakje en washandje op het gezwollen gezichtsdeel te leggen. U mag dit niet langer doen dan 15 minuten per uur.

Hechtingen

De hechtingen vallen er vanzelf uit, tenzij anders aan u is verteld.

Ziekenhuis raadplegen

Door de operatie kunnen complicaties ontstaan. In de volgende situaties neemt u contact op met het ziekenhuis.

Forse zwelling

De zwelling wordt in de loop van de week minder. Als de zwelling niet verdwijnt of erger wordt, moet u contact opnemen.

Hoge koorts

Heeft uw kind in de eerste drie dagen na de operatie 39°C koorts of hoger? Neem dan contact op met de Spoedeisende hulp.

Slikklachten

Heeft uw kind moeite met slikken van vloeistoffen? Neem dan contact op.

Nabloeden

Na één tot twee uur kunnen kleine bloedingen optreden. U hoeft zich daar niet ongerust over te maken. Deze kleine bloedingen zijn bijna altijd te stoppen door met een opgevouwen verbandgaasje (geen watten) de wond gedurende dertig minuten stevig aan te drukken. Als er toch steeds bloedstolsels in de mond van uw kind komen en uw kind steeds bloed in de mond heeft moet u contact opnemen.

Heftige pijn

Pijn bij uw kind kunt u verminderen door de voorgeschreven pijnstillers aan uw kind te geven. Als de pijn niet minder wordt, moet u contact opnemen.

Contact

Heeft u vragen of problemen die niet kunnen wachten tot de volgende controle op de polikliniek? Neem dan contact met ons op. Op werkdagen neemt u contact op met de polikliniek Kaakchirurgie, via 010 – 893 0000. Na kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de Spoedeisende Hulp, via 010 – 893 9393.

Bij vragen over verpleegkundige zorg, kunt u contact opnemen met de kinderafdeling, via 010 – 893 0000.