

**RÖNTGENONDERZOEK VAN DE
BAARMOEDER EN DE EILEIDERS (HSG)**

FRANCISCUS VLIETLAND

Dhr./mevr.:.....

U wordt verwacht op :..... **tijd:**.....

Dit onderzoek, ook wel "hysterosalpingografie" genoemd, vindt plaats op de afdeling Radiologie, op de begane grond. Hier meldt u zich op de afgesproken tijd.

Vergeet niet **uw aanvraagbrief van de arts** en uw stickervel, voorzien van de juiste gegevens, mee te nemen. Zijn uw gegevens gewijzigd? Geef dit dan vóór uw afspraak door bij de Inschrijfbalie op de begane grond.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten. Na het onderzoek (ongeveer 15 minuten later) wordt er nog een foto van de buik gemaakt.

Doel van het onderzoek

Dit onderzoek is bedoeld om eventuele afwijkingen aan uw baarmoeder zichtbaar te maken; ook kan worden vastgesteld of uw eileiders doorgankelijk zijn.

Vorbereiding

U moet de pijnstillers die u van de afdeling gynaecologie gekregen heeft op de afgesproken tijdstippen innemen. Verder is er voor dit onderzoek geen voorbereiding nodig.

Röntgenstraling

Bij dit onderzoek maken we gebruik van röntgenstraling. Moderne apparatuur stelt ons in staat zeer zorgvuldig om te gaan met de toe te dienen straling.

Zwanger

Indien u vermoedt dat u zwanger bent, ook als u het nog niet helemaal zeker weet, neemt u dan van tevoren telefonisch contact op met onze afdeling of met de polikliniek gynaecologie. Het is niet verstandig de ongeboren baby aan deze straling bloot te stellen.

Het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats in de röntgenkamer en wordt uitgevoerd door een gynaecoloog, in samenwerking met een radioloog (dit is een gespecialiseerd arts) en een radiodiagnostisch laborant(e).

Voor dit onderzoek moet u zich uitkleden. U mag een hemd of T-shirt aanhouden. Tijdens het onderzoek ligt u op de onderzoektafel. De arts schuift een spreider (speculum) in de vagina (schede). Daarna worden de vagina en de baarmoedermond schoongemaakt met een jodiumoplossing.

Met een speciaal instrumentje wordt vervolgens een buisje in de baarmoedermond gebracht. Dit kan even gevoelig zijn. Door het buisje wordt contrastvloeistof ingespoten. Dit kan pijn (krampen) veroorzaken in de onderbuik. Tijdens het inspuiten van de vloeistof worden door de radioloog röntgenfoto's gemaakt van de baarmoeder en de eileiders. Als de foto's goed zijn, worden de instrumenten verwijderd en mag u weer opstaan.

Overgevoelig

De contrastvloeistof die wij gebruiken bevat jodium. Sommige mensen zijn overgevoelig voor jodium. Bent u overgevoelig voor jodium, bespreek dit dan met uw behandelend arts. Vertel dit voor aanvang van het onderzoek ook aan de laborant en gynaecoloog.

Na het onderzoek

Na het onderzoek is de onderbuik soms wat gevoelig of pijnlijk. Er kan soms contrastvloeistof en wat bloed naar buiten vloeien. Hiervoor krijgt u een maandverbandje mee.

De uitslag

Na het onderzoek bespreekt de gynaecoloog de uitslag met u en eventueel uw partner. Voor vragen kunt u, ook telefonisch, contact opnemen met de medewerkers van de afdeling radiologie of polikliniek gynaecologie.

Bij verhindering

Als u niet op de afgesproken tijd kunt komen, wilt u dan minimaal 24 uur van tevoren de afspraak annuleren of verzetten? Anders zijn wij genoodzaakt het onderzoek in rekening te brengen.

Februari 2011