

SUPRAPUBISCHE KATHETER

FRANCISCUS VLIETLAND

Inleiding

In overleg met uw arts zal er bij u een suprapubische blaaskatheter ingebracht worden. Het doel van deze katheter is om permanent de urineafvoer uit de blaas te waarborgen.

Vorbereiding

De ingreep vindt onder steriele omstandigheden plaats om infectie te voorkomen. Voor de ingreep wordt de buikwand geschoren, net boven het schaambeentje. U hoeft voor de ingreep niet nuchter te zijn. Wanneer u bloedverdunnende middelen gebruikt, zal deze medicatie een aantal dagen van tevoren gestaakt worden.

De operatie

De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Vooraf zal vaak een blaaskatheter ingebracht worden via de plasbuis om de blaas te kunnen vullen. Na desinfectie van de buikwand wordt de huid verdoofd met een injectie. Vervolgens maakt de arts ter plaatse van de verdoofde huid een klein sneetje van 1 cm. Hierna wordt met een dikkere naald de blaas aangeprikt. Dit kan een pijnlijke gevoel geven. Vervolgens wordt een katheter geplaatst. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten.

Complicaties van de ingreep

- Bloedverlies uit de blaas ten gevolge van de punctie
- Schade aan de omliggende weefsels zoals een bloedvat of darmlis
- Het risico wordt kleiner indien de blaas goed gevuld kan worden voor de punctie. Bij twijfel kan eventueel met behulp van echografie de blaas gelokaliseerd worden.
- Bovengenoemde complicaties zijn uiterst zeldzaam.

Omgaan met de katheter

De insteekopening van de katheter moet dagelijks schoon gemaakt worden. Dit kan met gewoon water. Eventueel kan betadine zalf om de insteek opening gesmeerd worden. Op de katheter kan een urinezak worden aangesloten.

Verwisselen van de katheter

De verwisseling dient om de 6 à 8 weken plaats te vinden onder steriele omstandigheden. Meteen nadat de oude katheter is verwijderd, moet de nieuwe worden ingebracht, omdat het insteekkanaal vrij snel kan sluiten. Indien er veel steenaanslag plaatsvindt op de katheter kan de verwisseling soms beter vervroegd worden.

Complicaties

Blaaskrampen

Er wordt dan urine geperst naast de katheter. Dit kan ook een gevolg van een infectie zijn. Het urineverlies door blaaskramp kan ook via de plasbuis plaats vinden.

Verstopping van de katheter

De katheter dient gespoeld te worden of zonodig verwisseld te worden.

Uitvallen van de katheter

Wanneer de katheter is uitgevallen moet er zo snel mogelijk een nieuwe katheter ingebracht te worden, voordat het gaatje zich gesloten heeft (dit kan zeer snel zijn). Soms is het nodig om de katheter opnieuw te plaatsen.

Vragen

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Heeft u nog vragen, stel ze gerust! U kunt de polikliniek Urologie bereiken via het telefoonnummer 010 - 893 0000.